

インフルエンザ予防接種について

令和元年度インフルエンザ予防接種の予約受付を10月7日（月）から行います。

スマートフォン・パソコンをご利用可能な方は、当院のWeb 順番受付ページの「インフルエンザワクチン」から予約をお取りください。当院を受診されたことがない方でも、予約を取っていただくことができます。スマートフォン・パソコンからの予約ができない場合は、診療時間内に当院受付またはお電話（072-880-3387）にてご予約ください。

予防効果が期待できるのは、接種（13歳未満の方は2回目の接種）した日から、2週間から5カ月程度と考えられています。インフルエンザの流行は1～2月にピークを迎えることが多いことから、12月中旬までの接種をお勧めします。

実施期間：令和元年10月15日（火）～令和2年1月31日（金）

実施時間：診療時間内（**要事前予約**）

※予約はワクチンの確保であり、時間予約で予防接種の方を優先的に診察するわけではありません。予防接種当日には「一般診療」から順番予約を取っていただき、診察の時間が近づいたらお越しください。予防接種の方を優先的に診察するわけではありませんことを、ご了承ください。

対象年齢／推奨接種回数：

1歳以上 13歳未満…… 2回 （4週間空けることを推奨、最短2週間）
13歳以上…………… 1回

※1歳未満の方、妊娠中の方、高度のアレルギーがある方への接種は、当院ではいたしかねます。あしからずご了承ください。

接種費用：通常ワクチン（保存剤入り）	1回	3,300円
保存剤なしワクチン	1回	3,600円

※3歳未満の方は保存剤入りのワクチンのみとなります。

※十分なワクチンを確保する予定ですが、在庫状況によりご希望日に予約を取ることができない可能性がありますので、ご了承ください。

<通常ワクチン（保存剤入り）と保存剤なしワクチンの違い>

「保存剤」は、チメロサルという殺菌作用のある水銀（エチル水銀）を含んだ防腐剤を指しています。チメロサルによりアレルギー反応（発熱、発疹・じん麻疹、接種部位の腫れ、かゆみ）を生じることがありますので、これまでにインフルエンザワクチンで発熱したり腕が腫れたりしたことがある方や、アレルギー体質の方は「保存剤なしワクチン」の接種をおすすめします。

チメロサルは、これまで世界各国でワクチン容器の開封後の細菌汚染防止のために古くから使用され、従来使用されてきたインフルエンザワクチンの多くにも含まれてきました。「保存剤なし」「チメロサルフリー」と言われていないワクチンは保存剤を含んでいる製剤と考えていただいてもよいと思います。

予約の操作についての注意点

- ・予約が取れるのは2日後から8週間までとなっています。
- ・診察券がある方とない方を同時に予約することはできません。それぞれ予約をお取りください。
- ・2回接種が必要な場合、1回目の接種から2週間以内の日時には2回目の予約がとれません。
- ・2回接種が必要な場合、在庫確保のため1回目の予約を取られた際に2回目の予約もお取りいただくことをお勧めします。(1回目の予約直後に2回目の予約がとれない場合、できるだけ速やかに診療時間内に当院までご連絡ください。)
- ・当院の診察券がない方が予約日を変更する場合、元の予約をキャンセルしてからお取り直しください。
- ・インフルエンザ予防接種の予約を取られた方で、その予約枠がすでにいっぱいでお家族の予約を入れない方は、診療時間内にお電話ください。
- ・予約された時間枠の診療終了時にキャンセル・変更の連絡がない方は、ワクチンが確保されなくなります。接種日の変更を希望される方は予約システムで変更していただくか、当院までご連絡ください。

寝屋川市にお住まいで下記の条件を満たされる方は、市の助成が受けられます。

予防接種の当日は住所・氏名・年齢の確認のため、健康保険証をお持ちください。

●65歳以上の方：自己負担額 1,000円

※満60～65歳未満の方で、心臓・腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する身体障害者手帳1級の所持者も含まれます

●中学3年生までの小児：1回1,500円の助成(窓口にて上記接種費用から減額)

※初回接種時に1歳以上13歳未満の方は2回の助成が受けられます

※初回接種時に13歳以上の中学生の助成は1回までです

※子育てスタート応援クーポンは、インフルエンザ予防接種に利用できません

※当日付き添われる保護者の身分証明書(保険証や運転免許証)が必要です

■他の予防接種との同時接種(インフルエンザともう1種)を希望される場合、ワクチンの取り寄せが必要になりますので、**1週間以上先のインフルエンザワクチンの予約を取られた上で、**診療時間内にお電話ください。

■13歳未満の方で、諸事情により2回目の接種が4週間以上あく場合でも、2回目の接種で予防効果が期待できますので、2回目の接種をおすすめします。

■13歳以上の方は、1回接種で2回接種と同等の抗体価の上昇(予防効果)が得られるとされており、原則1回の接種で十分と考えられます。(厚生労働省ホームページより)

以下の方は当院では接種が行えません。

- ・1歳未満の方、妊娠中の方、高度のアレルギーがある方
- ・重度の急性疾患で治療中の方
- ・37.5℃以上の発熱がある方
- ・感染症にかかってから一定期間を経過していない方
- ・生ワクチン接種 27日以内、不活化ワクチン接種 6日以内

※生ワクチン：MR(麻しん・風しん)、ムンプス(おたふくかぜ)、水痘(水ぼうそう)、BCG等

※不活化ワクチン：4種混合・2種混合(百日咳、ジフテリア、破傷風、不活化ポリオ)、日本脳炎、肺炎球菌、インフルエンザ菌b型(ヒブ)、B型肝炎等